



Инструкция

по применению таблеток «Заманиха Плюс»

«Заманиха Плюс» — биологически активная добавка, созданная на основе натуральных экстрактов и предназначенная для поднятия либидо. Изготовлена по специальной формуле, обеспечивающей таблеткам мгновенную растворимость, поэтому они быстро действуют и отличаются высокой эффективностью. Средство оказывает тонизирующий, стимулирующий и гармонизирующий эффекты, является источником арбутина, бета-ситостерина, катехинов, танинов, кофеина.

Фармакологическое действие

Однократный приём «Заманихи Плюс»:

- поднимает общий тонус и настроение;
- способствует психологическому раскрепощению;
- усиливает либидо;
- облегчает достижение оргазма и усиливает ощущения.

Курсовой приём БАДа:

- поможет укрепить иммунитет, нервную систему, повысить устойчивость к стрессам;
- способствует достижению сексуальной гармонии с партнёром;
- благоприятно воздействует на кожу, делает её гладкой и шелковистой;
- улучшает зрение, придаёт блеск глазам.

Показания к применению

- Низкое либидо.
- Ослабление оргастических ощущений во время интимной близости.

Состав: экстракты корней заманихи высокой, зелёного чая, листьев дамианы, корней муира пуамы, лимонная кислота, натрий двууглекислый, сорбит, ароматизатор «Апельсиновый сок», подсластитель «Сладин 200К», глюкоза.

Способ применения и дозировка



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Взрослым женщинам по 1–2 таблетки в первой половине дня во время еды, растворяя в 100–200 мл горячей воды или других напитков (чай, какао, кофе). При разведении наблюдается кратковременное вспенивание. Если растворять таблетку в холодной жидкости (вода, сок), то допустимо наличие небольшой взвеси.

Максимальная доза — не более 2-х таблеток в день.

Для проявления эффекта принимать сразу 2 таблетки 1 раз в день, когда предполагается половая близость.

Продолжительность приёма при курсовом лечении — 1 месяц.

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость компонентов БАД;
- беременность;
- кормление грудью;
- повышенная нервная возбудимость;
- выраженный атеросклероз;
- бессонница;
- повышенное артериальное давление;
- нарушение ритма сердечной деятельности;
- приём в вечернее время.

Перед использованием препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Нет информации от производителя.

Условия хранения: в сухом, защищённом от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Срок годности: 2 года. Дата выпуска указана на упаковке.

Примечание: препарат не является лекарственным средством.